

«Stomatologiya» - научно-практический журнал. Основан в 1998 году.
Зарегистрирован повторно Агентством печати и информации Республики Узбекистан 15 августа 2007 г.
Свидетельство № 0289.

STOMATOLOGIYA **№2, 2025 (99)**

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Олий аттестация комиссияси (ОАК) қарорига асосан «Stomatologiya» журнали Фан доктори илмий даражасига талабгорларнинг диссертация ишлари илмий натижалари юзасидан илмий мақолалар эълон қилиниши лозим бўлган республика илмий журналлари рўйхатига киритилган (ОАК Раёсатининг 2013 йил 30 декабрдаги 201/3-сон қарори билан тасдиқланган)

ТАҲРИРИЯТ МАНЗИЛГОҲИ:

100048, Ўзбекистон Республикаси,
Тошкент ш., Махтумқули кўчаси, 103
тел.: +99871-236-26-75;
факс: +99871-230-47-58
Интернетдаги манзилгоҳи:
stomjurnal.tibbiyot.com.

Компьютерда терувчи: Е.Алексеев
Дизайнер ва саҳифаловчи: Г.Назирова
Мухаррир О.А.Козлова
Баҳоси келишилган нархда.

Рекламани чоп қилиш ҳақ тўлаш йўли билан амалга оширилади.

Реклама матнининг тўғрилиги бўйича жавобгарлик реклама берувчи зиммасидадир.

Қўлёзмалар, суратлар ва расмлар тақриз қилинмайди ҳамда эгасига қайтарилмайди.

Келтирувчи фактларнинг тўғрилиги, рақамли материалларнинг аниқлиги, препаратларнинг номлари, атамалар, илмий-адабий манбалар, исм ва фамилияларнинг тўғрилиги учун жавобгарлик муаллифларнинг ҳамда таҳририят ҳайъатининг зиммасидадир.

Бош муҳаррир: т.ф.д., проф. Нигматов Р.Н.

Бош муҳаррир муовини:

т.ф.д., проф. Жуматов У.Ж.

Масъул котиб: т.ф.н., доц. Рахматуллаева Д.У.

ТАҲРИРИЯТ ҲАЙЪАТИ

Ando Masatoshi – АҚШ
Baek il Kim – Жанубий Корея
Daisuke Inaba – Япония
Elbert de Josselin de long – Голландия
Jin Young Choi – Жанубий Корея
Peter Botenberg – Бельгия
Абдуллаев Ш.Ю., т.ф.д., проф.
Азимов М.И., т.ф.д., проф.
Акбаров А.Н., т.ф.д., проф.
Алиева Р.К. (Озарбайжон), т.ф.д., проф.
Амануллаев Р.А., т.ф.д., проф.
Бекжанова О.Е., т.ф.д., проф.
Боймуродов Ш.А. (Тошкент), т.ф.д., проф.
Ғаффоров С.А., т.ф.д., проф.
Даминова Ш.Б., т.ф.д., проф.
Ирсалиев Х.И., т.ф.д., проф.
Колбаев А.А. (Қирғизистон), т.ф.д., проф.
Комилов Х.П., т.ф.д., проф.
Маргвелашвили В.В. (Грузия) т.ф.д., проф.
Нигматова И.М., т.ф.н., доцент
Ризаев Ж.О., т.ф.д., проф.
Рузудинов С.Р. (Қозоғистон), т.ф.д., проф.
Тоиров У.Т. (Тожикистон), т.ф.д., проф.
Хабиров Н.Л., т.ф.д., проф.
Хасанов А.И., т.ф.д., доц.
Юлдошев И.М. (Қирғизистон), т.ф.д., проф.

ТАҲРИРИЯТ КЕНГАШИ

Абдукодиров А.А. (Тошкент), т.ф.д., проф.
Ғуломов С.С. (Тошкент), т.ф.д., проф.
Исмоилов М.М. (Фарғона)
Кисельникова Л.П. (Россия), т.ф.д., проф.
Тулаганов Б.О. (Тошкент вилояти)
Усмонов Ф.К. (Тошкент), т.ф.н., доц.
Узакбергганова У.А. (Нукус)
Хасанова Л.Э. (Тошкент), т.ф.д.
Худанов Б.О. (Тошкент), т.ф.д.
Шукурова У.А. (Тошкент), т.ф.д.
Юлдошев А.А. (Тошкент), т.ф.д.

СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Akbarov A.N., Ziyadullaeva N.S., Nurullayeva M.U. Mahalliy ishlab chiqarilgan yangi tish pastasining terapevtik va profilaktik samaradorligi va xavfsizligini eksperimental baholash6

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Хабибова Н.Н., Олимова Д.В. Гигиеническое состояние полости рта у пациентов с хронической болезнью почек, получающих и не получающих гемодиализ10

Burkhonova Z.K., Yarmuhammedov N.N. Covid-19 clinic in the oral cavity in a dentist's practice15

Toshtemirova M.M. The prevention and treatment of dental caries in patients with pulmonary tuberculosis17

Muratova S.K., Shukurova N.T. Clinical assessment of dental disease prognosis in individuals with cardiovascular pathology19

Чакконов Ф.Х. Интегративный подход к лечению хронического рецидивирующего афтозного стоматита21

Khaydarova D.M., Mukhtorov Sh.S., Kholboyev T. Sh. Increasing the efficacy of treatment for tooth pulp lesions in patients with chronic periodontitis23

Kosimova D.M. The pathogenetic mechanisms of chronic periodontitis in conjunction with periodontal diseases26

Акбаров А.Н., Жураева Н.И. Оптимизация метода рентгенологической диагностики при лечении хронического верхушечного периодонтита с использованием остеотропной пасты из биоактивного стекла28

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Kurbonov Yo. X., Boymuradov Sh.A., Shakirov A. A., Hayitmurodov D. E., Narmuratov B.Q. Turli sabablarga ko'ra yuz-jag' sohasida kelib chiqqan yiringli-nekrotik jarayonlarni klinik belgilari va davolashda qiyosiy yondashuv37

CONTENT

ORGANIZATION, EPIDEMIOLOGY, HISTORY AND EXPERIMENTAL SECTION

Akbarov A.N., Ziyadullaeva N.S., Nurullaeva M.U. Experimental evaluation of the therapeutic and prophylactic efficacy and safety of a new domestically produced toothpaste6

THERAPEUTIC DENTISTRY

Khabibova N.N., Olimova D.V. Oral hygiene in patients with chronic kidney disease receiving and not receiving hemodialysis10

Бурхонова З.К., Ярмухаммедов Н.Н. Клиника COVID-19 в полости рта в практике врача-стоматолога15

Тоштемирова М.М. Профилактика и лечение кариеса зубов у больных туберкулезом легких17

Муратова С.К., Шукурова Н.Т. Клиническая оценка прогноза стоматологических заболеваний у лиц с сердечно-сосудистой патологией19

Chakkonov F.Kh. Integrative approach to the treatment of chronic recurrent aphthous stomatitis21

Хайдарова Д.М., Мухторов Ш.С., Холбоев Т.Ш. Повышение эффективности лечения поражений пульпы зубов у больных хроническим пародонтитом23

Косимова Д.М. Патогенетические механизмы хронического пародонтита в сочетании с заболеваниями пародонта26

Akbarov A.N., Zhuraeva N.I. Optimization of the radiological diagnostics method in the treatment of chronic apical periodontitis using osteotropic paste made of bioactive glass28

SURGICAL DENTISTRY

Kurbanov Yu.Kh., Boymuradov Sh.A., Shakirov A.A., Khaitmurodov D.E., Narmuratov B.G. Comparative approach to clinical symptoms and treatment of purulent-necrotic processes of the maxillofacial region of various etiologies..37

indicators in patients with chronic brain ischemia //International Journal of Pharmaceutical research. – apr-jun (AKIII) – 2020. –Vol.12. issue 2 – P.1725-1728.

2. Sevinch E., Qobilovna B. Z. A study on the morphofunctional state of oral organ tissues during the use of non-removable orthodontic structures //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 247-253.

3. Yusufboy S., Qobilovna B. Z. Features of the structure of copd in elderly patients //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 363-368.

4. АЖ А Хайдаров, СК Муратова. Особенности микроциркуляции полости на фоне хронической ишемии мозга. Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси

5. Взаимодействие съёмного зубного протеза с тканями протезного ложа у больных с туберкулезом легких //Зуфаров С.А., Нигматов Р.Н., Рахматуллаев Ф.Т., Зуфаров А.С.// Среднеазиатский научно-практический журнал “Stomatologya”. Ташкент, 2001, № 1 (11). – С. –27-30.

6. Клинико-морфологическое изучение слизистой оболочки полости рта у больных с гипертонической болезнью //Нигматов Р.Н., Ирсалиев Х.И., Калменова Г.Т., Байбекова

Э.М.// Медицинский журнал Узбекистана. г.Ташкент, 2000. - № 5-6. - С.- 90-92.

7. ЛМД СК Муратова, НТ Шукурова. Эффективность применения противовоспалительных препаратов при лечении пациентов с заболеваниями пародонта у лиц среднего возраста. Современные достижения стоматологии, 83-84

РЕЗЮМЕ. Цель: разработка и оценка эффективности модели для индивидуального прогнозирования риска развития стоматологических заболеваний у пациентов с сердечно-сосудистой патологией.

Методы исследования:Мы обследовали 112 пациентов с сердечно-сосудистой патологией в возрасте от 36 до 65 лет (средний возраст $45,32 \pm 0,22$ года), госпитализированных в терапевтическое стоматологическое отделение.

Заключение: После клинического обследования компьютерная программа «Прогностическое моделирование вероятности развития заболеваний пародонта у пациентов с соматическими заболеваниями» может быть рекомендована для использования в практическом здравоохранении.

Ключевые слова: периодонтит, сердечно-сосудистая система (ССС), аритмия, гомеостаз, полость рта, соматические заболевания.

УДК: 616.31-002.2+616.37

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА



Чакконов Ф.Х.

Самаркандский государственный медицинский университет


По сей день сохранение общего самочувствия человека, его физиологической и профессиональной активности считается одной из важнейших задач восстановительной медицины.

В связи с этим приоритетным направлением ее развития считается разработка немедикаментозных технологий, способствующих активации резервных и адаптации организма

для первичной профилактики и предупреждения рецидивов при социально важных болезнях воспалительного дистрофического гинеза, в частности таких как, хронический рецидивирующий афтозный стоматит

(ХРАС), который часто встречается в нашем республике Узбекистан. Динамика ведущих жалоб у больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом после 5 процедур.

■ 20-30лет ■ 30-40 лет ■ 40-50 лет ■ 50-60 лет



Метод и материалы:

1 ая группа или же основная (20 пациентов). Выполняли последовательное без временного интервала воздействие магнито-лазерной терапии и настойки прополиса на слизистую оболочку полости рта.

2 ая группа или же сравнительная (10 пациентов). Воздействие магнито-лазерных лучей на слизистую оболочку полости рта.

3 группа контрольная (10 пациентов). Лечение аппликациями настойки прополиса на слизистую оболочку полости рта.

Результаты исследования: Улучшения основных симптомов местного воспаления слизистой оболочки и беспристрастно выявляется во время стоматологических обследований. Согласно вышесказанному, у пациентов ведущей группы наблюдалось более специфическое заживление эрозий слизистой оболочки и язв, которые возникали у 50% пациентов с абсолютной селективной эпителизацией 55%. Соответственно, этому способствовало рецидив обструкции слизистой оболочки полости рта у 60% и 50% больных с болью и значительное снижение у остальных пациентов. Из-за этого наблюдалась полная эпителизация язв и эрозий, также в основной группе прекращалось появление болей. После 6 месяцев применения магнитной лазерной терапии и настойки прополиса результаты после лечения сохранились, в то время как магнитная лазерная терапия дей-

ствительно лишилась свойств последующего выздоровления, но не достигла своего начального значения.

Заключение: доказано наиболее стойкая ремиссия после процедур наблюдалась у больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом при сочетанном применении магнито-лазерной терапии и настойки прополиса

Литература:

1. Sevinch E., Qobilovna B. Z. A study on the morphofunctional state of oral organ tissues during the use of non-removable orthodontic structures //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 247-253.
2. Yusufboy S., Qobilovna B. Z. Features of the structure of copd in elderly patients //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 363-368.
3. Mukhtasar, A. (2022). Changes in immunological indicators of the oral liquids in children at the stages of orthodontic treatment. *Thematics Journal of Education*, 7(3).
4. Axtamovna R. K. Tactics for Choosing Local Anesthetics in Patients with Concomitant Pathology //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 5. – №. 02. – С. 165-167.
5. Axtamovna R. K. Congenital Dental Anomalies: Systemic Hypoplasia, Fluorosis,

Tetracycline Staining, And Localized Hyperplasia //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 5. – №. 02. – С. 162-164.

РЕЗЮМЕ. Цель исследования: Предоставить научное обоснование и целесообразность поочерёдного, комплексному действия магнито-лазерной терапии и настойки прополиса для профилактики и лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита.

Методы исследования: Обследовались 40 пациентов с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом лечившихся на базе кафедры ортопедической стоматологии СамГМУ.

Результаты исследования: применения магнито-лазерной терапии и настойки прополиса у больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом и привело к умиротворению всех симптомов ХРАС.

Заключение: Разработанный комплексный метод применения магнито-лазерной терапии и настойки прополиса является более эффективным нежели их раздельное применение у

больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом.

Ключевые слова: ХРАС, магнито-лазерная терапия, настойка прополиса,

РЕЗЮМЕСИ. Tadqiqotning maqsadi: surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitning oldini olish va davolash uchun magnit-lazer terapiyasi va propolis nastoykasining navbatma-navbat, kompleks ta'sirini ilmiy asoslash va maqsadga muvofiqligini ta'minlashdan iborat.

Tadqiqotning usullari: SamDTU ortopedik stomatologiya kafedrasi bazasida davolangan surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit bilan kasallangan 40 nafar bemor tekshiruvdan o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari: surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit bilan og'rigan bemorlarda magnit-lazer terapiyasi va propolis nastoykasini qo'llash SQASning barcha belgilarini nazorat qilishga olib keldi.

Xulosa: Magnito-lazer terapiyasi va propolis nastoykasini qo'llashning ishlab chiqilgan kompleks usuli surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit bilan og'rigan bemorlarda ularni alohida qo'llashga qaraganda samaraliroqdir.

Kalit so'zlar: SQAS, magnit-lazer terapiyasi, propolis nastoykasi.

УДК: 616.735.8.002.61:34.47.002.33.10/27

INCREASING THE EFFICACY OF TREATMENT FOR TOOTH PULP LESIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS



Khaydarova D.M., Mukhtorov Sh.S., Kholboyev T. Sh.
Samarkand state medical university

Conclusion: The utilisation of antioxidants in the complex therapy of chronic periodontitis significantly enhances the susceptibility of periodontal tissues to treatment. This is demonstrated by the enhancement of their functional and metabolic state, which is achieved by enhancing

the trophic state of the tissue and the functional characteristics of blood form elements, as well as by reducing the level of products in the blood that have a membrane destabilising effect.

Annotation. The most severe and widespread periodontal pathology is chronic generalised